## Zum Verzeichniss der paläarctischen Ceuthorrhynchinen. (D. E. Z. 1902, 205—226.)

## Berichtigungen und Ergänzungen.

S. 205 Z. 9 v. oben lies: "punctum-album" statt punctatum-album.

S. 205 Z. 8 v. unten, hinter algerinus etc. hinzusetzen:

1878, Bull. Ac. d'Hippon. 13, 98.

S. 205 Z. 5 v. unten, hinter angustus etc. zu setzen:

"La Calle: Marocco". Alger. zu streichen.

- S. 206 Z. 13 v. oben unter subfarinosus Schze als Synonym zu setzen: subplagiatus Desbr. Frelon VII, 1899, p. 31.
- S. 206 Z. 15 v. oben lies: "erythrolewcus" statt erythrolencus.
- S. 206 Z. 13 v. unten zu v. siculus Schze noch: D. E. Z. 1901, 93.
- S. 206 Z. 1 v. unten lies: "aequabilis" statt aequalibis.
- S. 207 Z. 3 v. oben unter v. rubricollis noch:

v. nigritarsis Hartmann [Separat]. - Schwarzwald.

- S. 208 Z. 9 v. oben lies: "massageta" statt massagetus.
- S. 208 Z. 10 v. oben hinter fallaciosus etc. noch zu setzen: Marocco.
- S. 208 Z. 17 v. oben lies für Genus Coelogaster (schon vergeben)

  Ectamnogaster.
- S. 208 Z. 18 v. oben hinter caviventris etc. noch: Aïn-Draham: Tunis.
- S. 208 Z. 19 v. oben lies: "arxius" statt auxius.
- S. 208 Z. 1 v. unten vor pulvillus var. zu setzen.
- S. 209 Z. 1 v. oben unter asperatus als Synonym zu setzen:

  macrasper Reitt. Wien. E. Z. 1901, 130.
- S. 209 Z. 2 v. oben Weisei Reitt. zu streichen (siehe S. 213, Z. 9).
- S. 209 Z. 3 v. oben hinter fallax lies: "VIII, 1" statt VIII, 2, 142. Unter fallax als Synonym: simplicicollis Reitt. Wien. 1901.
- S. 209 Z. 12 v. unten podagricus Schze zu streichen (siehe Nachtrag unter: sphaeroides Pic).
- S. 209 Z. 7 v. unten unter serratus als Synonym:

carpathicus Brancs. — Carpath.

- S. 210 Z. 6 v. oben lies: "1899, 293" statt 1900, 17.
- S. 210 Z. 10 v. oben hinter validirostris etc. noch:

D. E. Z. 98, 166, 16; Termesz. 93, 87.

- S. 210 Z. 11 v. oben unter Speiseri als Synonym:

  Kaufmanni Reitt. (Cidnorrhin.) Wien. E. Z. XX, 86.
- S. 210 Z. 15 v. oben unter alpinus als Synonym:

Ganglbaueri Reitt. Wien. Z. 91, 261 (Rhytidosom. olim).

S. 210 Z. 6 v. unten unter v. rufescens uoch: v. chinensis Schze D. E. Z. 1901, 94. — Tientsin.

S. 211 Z. 18 v. oben zu muricatus noch: Croatia.

S. 211 Z. 15 v. unten zu granatus noch: Alger.

S. 211 Z. 12 v. unten zu quadrinodosus noch: Aulie-Ata: Turkst.

S. 211 Z. 3 v. unten lies: "velutus" statt relatus.

S. 212 Z. 7 v. oben zu Speiseri noch: Ruma: Slavon., Dalmat.

S. 212 Z. 10 v. oben spinosus etc. zu streichen (Trachyphloeus).

S. 212 Z. 14 v. oben zu baldensis noch: Bosnia, Gross. St. Bernhard.

S. 212 Z. 13 v. unten zu Barnevillei noch: Bavar. Austr. Croat. Slav.

S. 212 Z. 12 v. unten zu centrimacula als Synonym:

propinquus Ch. Bris. i. litt.

S. 212 Z. 11 v. unten hinter rufulus noch:

1851 in Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 346.

S. 212 Z. 8 v. unten lies: "Gall. m." statt Bretonia.

S. 212 Z. 4 v. unten zu v. rufescens hinter D. E. Z. noch:

98, p. 267, 15; l. c. 1901, 94.

S. 212 Z. 4 v. unten unter v. rufescens als Synonym:

Olcèsi (Allodactylus) Pic, Miscell. Ent. 1896.

S. 213 Z. 9 v. oben unter *pubicollis* als Synonyme:

Weisei Reitt. (Allodact. Coeliod.) Wien. E. Z. 1888, 272.

Sequensi Stierl. i. litt.

S. 213 Z. 8 v. unten lies: "Oran" statt Bona.

S. 213 Z. 4 v. unten zu geographicus noch: Madera.

S. 213 Z. 2 v. unten zu Korbi noch Herzegowina.

S. 214 Z. 1 v. oben zu Beckeri noch Hannover.

S. 214 Z. 16 v. unten pratensis zu streichen

(= molitor Gyllh. S. 216, Z. 3 v. unten).

S. 214 Z. 3 v. unten hinter trimaculatus lies: "Alger." statt Caucas.

S. 215 Z. 1 v. oben hinter Desbroch. noch:

Frelon 93, III, 5. - Luco, Arezzano: Abruzz.

S. 215 Z. 6 v. oben unter Diecki als Synonym: Pagenettii Stierl. i. litt.

S. 215 Z. 11 v. oben lies: "Henri" statt Ch. Bris.

S. 215 Z. 13 v. oben bei quadripunctatus lies: "121" statt 120.

S. 215 Z. 14 v. unten bei venedicus noch: Croatia.

S. 215 Z. 5 v. unten lies: "Stett. e. Z." statt Storia.

S. 216 Z. 6 v. oben lies: "symphyti" statt symphiti.

S. 216 Z. 9 v. oben zu angulosus noch Synonym:

balsaminae Guillebeau 1885, l'Échang. I, 3. — Gall. alp.

S. 216 Z. 3 v. unten unter molitor als Synonym:

pratensis Chevr. Rev. zool. 1860, 510.

- S. 217 Z. 2 v. oben v. figuratus ist eigene Art.
- S. 217 Z. 9 v. oben zu gallicus noch: Gyllh.
- S. 217 Z. 10 v. oben zu rubiginosus noch: Tunis.
- S. 218 Z. 20 v. oben sparsutus Schze ist Synonym von fennicus Fst. (siehe Nachträge).
- S. 218 Z. 16 v. unten zu Ragusae noch: Triest.
- S. 218 Z. 14 v. unten unter pilosellus als Synonym:

Gobanzi Reitt. (Ceuth'dius) Wien. E. Z. X, 262.

S. 219 Z. 6 v. oben zu obsoletus als Synonym:

dalmatinus Stierl. Schwz. Mitt. 94, 120.

als var. obscuripes Schze D. E. Z. 1903, 292. — Ruman. Alger.

- S. 219 Z. 10 v. oben lies "Henri" statt Ch. Br.
- S. 219 Z. 13 v. unten bei tenietensis lies: "1896, V, 48" statt 85-86.
- S. 219 Z. 11 v. unten zu canescens noch Schze.
- S. 219 Z. 8 v. unten emeritus ist Synonym von Brisouti Faust.
- S. 220 Z. 2 v. oben für Horni (schon vergeben) Waltheri zu setzen.
- S. 220 Z. 17 v. oben bei changaicus noch Schze.
- S. 220 Z. 18 v. oben bei transcaspicus noch Schze.
- S. 220 Z. 19 v. oben pratensis zu streichen

(= molitor Gyllh. S. 216, Z. 3 v. unten).

- S. 220 Z. 8 v. unten filirostis ist var. von cochleariae.
- S. 220 Z. 1 v. unten lies "Ahngeri" statt Angheri.
- S. 221 Z. 1 v. oben zu seniculus Ch. Bris.: Ann. de France 1882, 117.
- S. 221 Z. 6 v. oben lies "Djelfa" statt Djella Pic.
- S. 221 Z. 7 v. oben hinter similis Hung. Balk. zu streichen, statt dessen: Baden, Jaroslaw.
- S. 221 Z. 9 v. oben lies "Armorica" statt Bretonia.
- S. 221 Z. 10 v. oben bei frater lies "1901" statt 1900.
- S. 221 Z. 19 v. oben lies "angusteelus" statt angustatus.
- S. 221 Z. 12 v. unten lies "Zurlo" statt zurlo.
- S. 222 Z. 13 v. oben unter rubescens als Synonym: erythropterus Stierl. (var. von querceti) Schw. Mitt. 94, 120.
- S. 222 Z. 11 v. unten depressicollis und
- S. 222 Z. 10 v. unten optabilis als Synoym hinter nigrinus Z. 6 v. u.
- S. 223 Z. 8 v. unten zu v. picitarsis noch: Buchara.
- S. 224 Z. 4 v. oben zu Gerhardti noch: Jaroslaw.
- S. 224 Z. 15 v. oben für carinifrons (schon vergeben) syriacus.
- S. 224 Z. 13 v. unten bei Grenieri lies "Henri Bris." statt Ch. Bris.
- S. 224 Z. 11 v. unten zu fulvipes noch: Marocco.
- S. 224 Z. 9 v. unten zu quadridens noch: Alger., Tunis, Marocco.

S. 224 Z. 5 v. unten unter cyanipennis: v. aenipennis Ch. Bris. — Ross. m. (s. S. 225, Z. 9 v. u.).

S. 224 Z. 1 v. unten Paganettii zu streichen.

S. 225 Z. 10 v. oben zu scapularis noch: Transbaical.

S. 225 Z. 10 v. unten zu clunicularis noch Schze.

S. 225 Z. 9 v. unten aeneipennis zu streichen

(var. von sulcicollis, s. S. 224, Z. 6 v. unt.).

S. 226 Z. 2 v. oben zu (chalybaeus) noch: Germar.

S. 226 Z. 3 v. oben chalybaeus Germ. Weise zu streichen

(Synonym von pectoralis Weise).

S. 226 Z. 4 v. oben Leprieuri Bris. eigene Art.

Gall. m. Hisp. m. zu streichen, dafür: Eurod. md. m.

S. 226 Z. 5 v. oben obesulus Weise Synonym des Leprieuri, desgl. Ruebsameni Kolbe Ent. Hefte 1901, 229.

S. 226 Z. 10 v. oben bei viridanus zu streichen: Europ. md. m. Alger.

S. 226 Z. 11 v. oben chlorophanus eigene Art, dazu:

Thuring. Austr. Ital. bor. Hung. Balkan.

S. 226 Z. 19 v. oben zu sulcatus noch: Beirut: Syria.

S. 226 Z. 8 v. unten neben Poophagus Schönh.: (Acnemiscelis Desbr.).

S. 226 Z. 4 v. unten unter Hopffgarteni als Synoyme:

araneipes Faust Hor. 16, 323. — Ross. araneipes Desbr. (Acnemiscelis).

## Nachträge.

(Die Nachträge sind einzuschalten in D. E. Z. 1902, p. 208-226.)

Oxyonyx inornatus Schze D. E. Z. 1903, 241. Transcasp.
. (hinter beryticus S. 208, Z. 1 v. oben)

Oxyonyx acutangulus Schze l. c. 1903, 242. Dschilarik: Sibir. (hinter Brisouti S. 208, Z. 7 v. oben)

Allodactylus Stierlini Faust

(hinter Thomsoni S. 209, Z. 7 v. oben)

Pseudophytobius (Hypurus) sphaeroides Pic Misc. ent. IV, 96, 5. Alger. (hinter continuatus S. 209, Z. 10 v. unten)

Rhinoncus v. chinensis Schze D. E. Z. 1901, 94. Tientsin. (var. von bruchoides S. 210, Z. 7 v. unten)

Ceuthorrhynchidius hassicus Schze D. E. Z. 1903, 244. Cassel. (vor Spurnyi S. 212 Z. 14 v. oben)

Ceuthorrhynchidius magnicollis Schze D. E. Z. 1903, 245.

Philippeville: Alger. (bei troglodytes Z. 17 v. oben)

Ceuthorrhynchus atticus Schze D. E. Z. 1903, 269. Athen. (bei urticae S. 215 Z. 19 v. oben) Ceuthorrhynchus suturalba Schze D. E. Z. 1903, 265. Budapest. (hinter cinnamomeus S. 216 Z. 13 v. unten) fennicus Faust Stettin. e. Z. 1894, 361 (olim Gyllenhali, Hor. XXIX, 105) Fennia, Hung. Ross. (hinter rufimanus S. 218 Z. 17 v. oben) cupidus Faust Horae 95, 106. Irkutsk. (hinter Ragusae S. 218 Z. 16 v. unten) gracilicornis Schze D. E. Z. 1903, 217. (bei biplagiatus S. 218 S. 8 v. unten) cribricollis Schze D. E. Z. 1903, S. 278. Herzegowina. (bei fulvitarsis Henri Bris. S. 219 Z. 10 v. oben) rhinoncoides (Cidnorrhin.) Reitt. Wien. 1901, 96. Tokmak: Sibir. (hinter asper Roel. Z. 14 v. oben) turbatus Schze D.E.Z. 1903, 284 (pumilus Ch. Bris. i. litt.) Germ. Hung. Balkan. (hinter similis S. 221 Z. 7 v. oben) confusus Schze D. E.Z. 1903, 263. Caucas., Heluan: Egypt. (hinter viator S. 221 unten) perversus Schze l. c. 264. Wolga: Ross. m. (unten dem Vorigen) sibiricus Faust Horae 95, 106. Irkutsk. (hinter Jakovlevi S. 222 Z. 16 v. oben) senilis Schze D. 1903, 281. Kasikoporan: Armen. ross. (vor coarctatus S. 224 oben) maroccanus Schze l. c. 284. Saffi: Marocco. (bei forticornis S. 224 Z. 14 v. oben) testudinella Schze l. c. 279. Kasikoporan: Armen. ross. (hinter funicularis S. 224 Z. 23 v. oben) Henschi Schze l. c. 282. Budapest. (vor erysimi S. 225 Z. 23 v. oben)

Poncyi<sup>1</sup>) Stierl. Bull. Soc. Bukar. VIII, 1899, 369. Ruman. submuricatus Hochh. Bull. Mosc. 1851, I, p. 99.

Asow. Meer (Motsch.).

A. Schultze.

<sup>1)</sup> Beide Arten unter dem Strich mir unbekannt.